

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DA GESTANTE – ATENÇÃO BÁSICA

FICHA

01

I – ORIGEM DA PACIENTE:

UNIDADE DE SAÚDE: _____

MUNICÍPIO: _____

DATA DO ATENDIMENTO: ___/___/____

II – IDENTIFICAÇÃO:

NOME: _____

CARTÃO DO SUS: _____ Nº DA ESF: _____

COR: BRANCA () PRETA () PARDA () AMARELA () INDÍGENA ()

ESTADO CIVIL: CASADA () UNIÃO ESTÁVEL () SOLTEIRA () DIVORCIADA () OUTRO ()

ENDEREÇO: _____

FONE: () _____ DATA DE NASCIMENTO: ___/___/____ IDADE: _____

III – ASSINALE COM CÍRCULO O NÚMERO CORRESPONDENTE A RESPOSTA:

1. IDADE:	PONTUAÇÃO
< 15 anos	2
de 15 a 19 anos	1
de 20 a 34 anos	0
≥ 35 anos	1

2. RENDA FAMILIAR <i>per capita</i> :	PONTUAÇÃO
Até ½ salário	1
≥ ½ salário	0

3. Aceitação da GRAVIDEZ	PONTUAÇÃO
Aceita	0
Não Aceita	1




4. ESCOLARIDADE - alfabetizada	PONTUAÇÃO
Sim	0
Não	1

5. HÁBITOS	PONTUAÇÃO
Tabagista	2
Etilismo	5
Drogas (cocaína, crack, outras)	10

6. FATOR RH	PONTUAÇÃO
Negativo	4
Positivo	0

7. AVALIAÇÃO NUTRICIONAL	PONTUAÇÃO
Baixo peso (IMC < 18,5 kg/m ²) e/ou ganho de peso inadequado e/ou anemia	2
Peso adequado (IMC 18,5 – 24,9 kg/m ²)	0
Sobrepeso (IMC 25 – 29,9 kg/m ²)	2
Obesidade (IMC > 30 kg/m ²)	5

8. ANTECEDENTES OBSTÉTRICOS	PONTUAÇÃO
Abortos espontâneos < 3	5
Abortos espontâneos 3 ou mais	10
1 Natimorto/prematuro/óbito perinatal	5
Mais de 1 filho prematuro / natimorto	10
Cesárea 3 ou mais	5
Pré-eclâmpsia leve	5
Pré-eclâmpsia grave	10
Eclâmpsia	10
Placenta prévia	5
Deslocamento Prematuro da Placenta	5
Incompetência Istmo Cervical	10
Restrição de Crescimento Intrauterino	5
Malformação fetal	5
Ultimo parto < 12 meses	2
Intervalo Interpartal ≥ 5 anos	5
Trombose Venosa Profunda/Embolia	10
Esterilidade/Infertilidade	5

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	TOTAL DE PONTOS
Vermelho  Alto Risco	≥ 10
Amarelo  Médio Risco	De 5 a 9
Verde  Baixo Risco	≤ 4
TOTAL	

FATORES DE RISCO PARA PRE-ECLÂMPSIA	SIM	NÃO
Pré-eclâmpsia / Eclâmpsia anterior		
Doença autoimune		
Diabetes mellitus		
Gestação múltipla atual		
Hipertensão crônica		
Hipertensão gestacional anterior		
Raça negra		
Intervalo Interpartal ≥ 5anos		
Obesidade		
Fatores socioeconômicos desfavoráveis		
Doença Renal		

Profissional Responsável
(assinatura e carimbo)

9. PATOLOGIAS NA GESTAÇÃO ATUAL

I. OBSTÉTRICAS E GINECOLÓGICAS	PONTUAÇÃO
Doença Hipertensiva da Gestação	10
Diabetes Gestacional	10
Câncer Materno	10
Citologia Cervical Anormal (NIC II-III)	10
Presença de nódulos à palpação mamária	10
Placenta prévia	10
Isoimunização	10
Malformações Fetais/ Arritmia fetal	10
Restrição de Crescimento Intrauterino	10
Poliidramnio/Oligoidamnio	10
Gravidez múltipla	10
Incompetência Istmo Cervical	10
Ameaça de Aborto	5
Anomalia do trato Geniturinário	5

II. MÉDICAS E CIRÚRGICAS	PONTUAÇÃO
Hipertensão Arterial Crônica	10
Diabetes Mellitus/Endocrinopatias	10
Cardiopatias	10
Pneumonia Grave	10
Doenças Autoimunes (Coladenose, lúpus)	10
Doença Renal Grave	10
Epilepsia/Doença Neurológica	10
Doenças Hematológicas	10
Infecção Urinária de Repetição	10
Infecções Graves	10
AIDS/HIV	10
Hepatite B	10
Tuberculose/Hanseníase	10
Toxoplasmose	10
Alterações Genéticas Maternas	10
Doenças Psiquiátricas	5

FATORES SÓCIOS ECONÔMICOS não são critérios isoladamente para encaminhamento ao Pré-Natal de Alto Risco. Atendimento diferenciado na Atenção Básica.

ALTO RISCO: Encaminhar ao Pré-Natal de Alto Risco, Classificação somando 10 ou mais pontos.

MÉDIO RISCO: Somatório de 5 a 9 pontos, receber atendimento com calendário de consulta diferenciado na Atenção Básica.

BAIXO RISCO: Somatório de até 4 pontos deve receber atendimento com calendário de consulta preconizado na Atenção Básica.

O atendimento na Atenção Básica deve ser intercalado por consulta médica e consulta de enfermagem.

A presença de um único fator de risco para pré - eclâmpsia, justifica o uso da aspirina, exceto o fator socioeconômico desfavorável isoladamente.